

Lista de “Indicadores” do SISCOLODW

Cada “indicador” é uma quantidade ou uma razão, frequentemente expressa como porcentagens.

Indicador (%) = (Numerador /Denominador)*100, Razão= (Numerador /Denominador)

Adequabilidade das lâminas

	Indicador	Numerador	Denominador
1	Número total de testes realizados	Número total de testes realizados	-
2	Porcentagem de lâminas satisfatórias	Número de testes com lâminas satisfatórias	Número total de testes realizados
3	Porcentagem de lâminas insatisfatórias	Número de testes com lâminas insatisfatórias	Número total de testes realizados
4	Porcentagem de lâminas rejeitadas	Número de testes rejeitados	Número total de testes realizados
5	Porcentagem de testes com células representativas apropriadas da zona de transformação (ZT)	Número de testes com células representativas apropriadas da zona de transformação (ZT)	Número de testes realizados com lâminas satisfatórias

Indicadores Citopatológicos

	Indicador	Numerador	Denominador
1	Porcentagem de testes dentro dos limites de normalidade	Número de testes com resultado “dentro dos limites normais”	Número de testes com lâminas satisfatórias
2	Porcentagem de testes com alterações celulares benignas reativas ou reparativas	Número de testes com resultado de “alterações celulares benignas reativas ou reparativas”	Número de testes com lâminas satisfatórias
3	Porcentagem de testes com resultados não alterados (normais ou com alterações benignas)	Número de testes com resultados "sem alterações”	Número de testes com lâminas satisfatórias
4	Porcentagem de testes com células atípicas de baixo risco	Número de testes com resultado "ASC-US ou LSIL“	Número de testes com lâminas satisfatórias
5	Porcentagem de testes com células atípicas de alto risco	Número de testes com resultado “ASC_H, AGC, AOI, HSIL, HSIL- não excluindo cancer microinvasivo, AIS e adenocarcinoma invasivo	Número de testes com lâminas satisfatórias
6	Porcentagem de testes com câncer	Número de testes com resultado “cancer”	Número de testes com lâminas satisfatórias
7	Porcentagem de testes com ASC-US - Células escamosas atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásico	Número de testes com resultado “ASC-US”	Número de testes com lâminas satisfatórias
8	Porcentagem de testes com ASC-H - células escamosas atípicas de significado indeterminado, não excluindo lesão intra-epitelial de alto grau	Número de testes com resultado “ASC-H”	Número de testes com lâminas satisfatórias
9	Porcentagem de testes com AGC - Células glandulares atípicas de significado indeterminado possivelmente não neoplásicas	Número de testes com resultado “AGC – possivelmente não neoplásicas”	Número de testes com lâminas satisfatórias
10	Porcentagem de testes com AGC-H - Células glandulares atípicas de significado indeterminado, não podendo afastar lesão intra-epitelial de alto grau	Número de testes com resultado “AGC-H”	Número de testes com lâminas satisfatórias
11	Porcentagem de testes com AOI - Células indefinidas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas	Número de testes com resultado “AOI - possivelmente não neoplásicas”	Número de testes com lâminas satisfatórias
12	Porcentagem de testes com AOI-H - Células indefinidas atípicas de significado indeterminado, não excluindo lesão intra-epitelial de alto grau	Número de testes com resultado “AOI-H”	Número de testes com lâminas satisfatórias
13	Porcentagem de testes com LSIL -	Número de testes com	Número de testes com

	Lesão intraepitelial de baixo grau	resultado “LSIL”	lâminas satisfatórias
14	Porcentagem de testes com HSIL - Lesão intraepitelial de alto grau, compreendendo neoplasias intraepiteliais cervicais graus II e III)	Número de testes com resultado “HSIL”	Número de testes com lâminas satisfatórias
15	Porcentagem de testes com lesão intraepitelial de alto grau, não excluindo microinvasão	Número de testes com resultado “Lesão intraepitelial de alto grau, não excluindo microinvasão”	Número de testes com lâminas satisfatórias
16	Porcentagem de testes com carcinoma invasivo	Número de testes com resultado “invasive squamous cell carcinoma”	Número de testes com lâminas satisfatórias
17	Porcentagem de testes com adenocarcinoma in situ	Número de testes com resultado “adenocarcinoma in situ”	Número de testes com lâminas satisfatórias
18	Porcentagem de testes com adenocarcinoma cervical invasivo	Número de testes com resultado “adenocarcinoma cervical invasivo”	Número de testes com lâminas satisfatórias
19	Porcentagem de testes com adenocarcinoma endometrial invasivo	Número de testes com resultado “adenocarcinoma endometrial invasivo”	Número de testes com lâminas satisfatórias
20	Porcentagem de testes com adenocarcinoma invasivo não específico	Número de testes com resultado “adenocarcinoma invasivo não específico”	Número de testes com lâminas satisfatórias
21	Razão entre lesões de baixo grau e alto grau	Número de testes com resultado “LSIL”	Número de testes com resultado NIC II ou NIC III
22	Razão entre lesões de alto grau e câncer	Número de testes com resultado “ HSIL ”	Número de testes com resultado “carcinoma da célula escamosa”
23	Índice de positividade do laboratório	Número de testes com resultado ASC-US; ASC-H; AOI, AGC, LSIL; HSIL; HSIL não excluindo cancer microinvasivo, AIS e adenocarcinoma invasivo	Número de testes com lâminas satisfatórias
24	Porcentagem de testes com células escamosas atípicas (ASC) dentre os testes com lâminas satisfatórias	Número de testes com resultado ASC-US ou ASC-H	Número de testes com lâminas satisfatórias
25	Porcentagem de testes com células escamosas atípicas dentre os testes com resultado “alterado”	Número de testes com resultado ASC-US ou ASC-H	Número total de testes com resultado alterado
26	Razão entre número de testes com células escamosas atípicas e com lesão intraepitelial escamosa	Número de testes com resultado ASC-US ou ASC-H	Número de testes com resultado LSIL ou HSIL

Indicadores Histopatológicos

No	Indicador	Numerador	Denominador
1	Número total de testes histopatológicos realizados		
2	Porcentagem de testes histopatológicos com lesões benignas	Testes histopatológicos com resultado “lesões benignas”	Número total de testes histopatológicos realizados
3	Porcentagem de testes histopatológicos com lesões neoplásticas ou pré-neoplásticas	Testes histopatológicos com resultado “lesões neoplásticas ou pré-neoplásticas”	Número total de testes histopatológicos realizados
4	Porcentagem de testes histopatológicos com NIC I (displasia leve)	Testes histopatológicos com resultado “NIC 1”	Número total de testes histopatológicos realizados
5	Porcentagem de testes histopatológicos com NIC II (displasia moderada)	Testes histopatológicos com resultado “NIC II”	Número total de testes histopatológicos realizados
6	Porcentagem de testes histopatológicos com NIC III (displasia grave/carcinoma <i>in situ</i>)	Testes histopatológicos com resultado “NIC III”	Número total de testes histopatológicos realizados
7	Porcentagem de testes histopatológicos com carcinomas	Testes histopatológicos com resultado “carcinoma”	Número total de testes histopatológicos realizados
8	Porcentagem de testes histopatológicos com adenocarcinoma	Testes histopatológicos com resultado “adenocarcinoma”	Número total de testes histopatológicos realizados

Participação

População alvo (25-64 anos)

Mulheres atendidas (25-64 anos)

Participação (Mulheres atendidas (25-64 anos) / População alvo (25-64 anos))

Acompanhamento de mulheres com teste citopatológico sem resultados anormais

Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado sem atipias no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com menos de 25 anos com resultado ASC-US/LSIL no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com mais de 29 anos com resultado ASC-US no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado HSIL no segundo teste citopatológico, não podendo excluir microinvasão ou carcinoma epidermóide invasivo ou adenocarcinoma in situ ou adenocarcinoma invasivo

Contagem de mulheres entre 25 e 29 anos com resultado de ASC-US no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com mais de 24 anos com resultado de NIC I no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com mais de 29 anos que não realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de ASC-US

Contagem de mulheres entre 25 e 29 anos que não realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de ASC-US

Contagem de mulheres com mais de 24 anos que não realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de NIC I

Contagem de mulheres que não realizaram um teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de HSIL

Contagem de mulheres com mais de 29 anos que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de ASC-US

Contagem de mulheres entre 25 e 29 anos que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de ASC-US

Contagem de mulheres com mais de 24 anos que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de NIC I

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de HSIL

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológico em mulheres com mais de 29 anos e o segundo teste com resultado ASC-US

Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológico em mulheres entre 25 e 29 anos e o segundo teste com resultado de ASC-US

Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológico em mulheres com mais de 24 anos e o segundo teste com resultado de NIC I

Tempo médio (meses) entre o segundo teste citopatológico e o teste histopatológico em mulheres com um segundo teste citopatológico com resultado de HSIL

Acompanhamento de mulheres com menos de 25 anos com um teste citopatológico com resultado de ASC-US ou LSIL

Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado sem atipias no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado de ASC-US/LSIL no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado de ASC-H/AGC/AOI/HSIL no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado de HSIL no segundo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico

Acompanhamento de mulheres entre 25 e 29 anos com um teste citopatológico com resultado de ASC-US

Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado de atipias no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um terceiro teste (cito/histopatológico) após o segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres com resultado sem atipias no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado sem atipias

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de atipias

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado sem atipia

Contagem de mulheres com um resultado de alto risco no teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres com um resultado de baixo risco no teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado de baixo risco

Contagem de mulheres com resultado de atipias no terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado sem atipia

Contagem de mulheres que não realizaram um quarto teste (cito/histopatológico) após um terceiro teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres com resultado sem atipias no terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado sem atipias

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado de baixo risco

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após um terceiro teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres que realizaram um quarto teste citopatológico após um terceiro teste com resultado de atipias

Contagem de mulheres com um resultado de alto risco no teste histopatológico após um terceiro teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres com um resultado de baixo risco no teste histopatológico após um terceiro teste citopatológico com resultado de atipias

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Tempo médio (meses) entre o segundo teste citopatológico e o próximo teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado sem atipia

Tempo médio (meses) entre o teste histopatológico com resultado de baixo risco e o próximo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o terceiro teste citopatológico com resultado de atipias e o próximo teste histopatológico

Tempo médio (meses) entre o terceiro teste citopatológico com resultado de atipias e o próximo teste citopatológico

Acompanhamento de mulheres com mais de 29 anos com um teste citopatológico com resultado de ASC-US ou mulheres com mais de 24 anos com com um teste citopatológico com resultado de HSIL

Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado de atipias no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um terceiro teste (cito/histopatológico) após o segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres com resultado sem atipias no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado sem atipias

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de atipias

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado sem atipia

Contagem de mulheres com um resultado de alto risco no teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres com um resultado de baixo risco no teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado de baixo risco

Contagem de mulheres com resultado de atipias no terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado sem atipia

Contagem de mulheres que não realizaram um quarto teste (cito/histopatológico) após um terceiro teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres com resultado sem atipias no terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado sem atipias

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado de baixo risco

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após um terceiro teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres que realizaram um quarto teste citopatológico após um terceiro teste com resultado de atipias

Contagem de mulheres com um resultado de alto risco no teste histopatológico após um terceiro teste citopatológico com resultado de atipias

Contagem de mulheres com um resultado de baixo risco no teste histopatológico após um terceiro teste citopatológico com resultado de atipias

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Tempo médio (meses) entre o segundo teste citopatológico e o próximo teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de atipias

Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado sem atipia

Tempo médio (meses) entre o teste histopatológico com resultado de baixo risco e o próximo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o terceiro teste citopatológico com resultado de atipias e o próximo teste histopatológico

Tempo médio (meses) entre o terceiro teste citopatológico com resultado de atípias e o próximo teste citopatológico

Acompanhamento de mulheres com teste citopatológico com resultado de ASC-H

Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um segundo teste (histo/citopatológico)

Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado negativo ou NIC I no teste histopatológico

Contagem de mulheres com resultado de cancer/adenocarcinoma no teste histopatológico

Contagem de mulheres com resultado de NIC II ou NIC III no teste histopatológico

Contagem de mulheres com um resultado de baixo risco no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com um resultado de alto risco no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I

Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco

Contagem de mulheres que realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o primeiro teste citopatológico e o próximo teste histopatológico

Tempo médio (meses) entre o teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I e o próximo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o segundo e terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco

Acompanhamento de mulheres com teste citopatológico com resultado de AGC

Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um segundo teste (histo/citopatológico)

Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado negativo ou NIC I no teste histopatológico

Contagem de mulheres com resultado de cancer/adenocarcinoma no teste histopatológico

Contagem de mulheres com resultado de NIC II ou NIC III ou adenocarcinoma in situ no teste histopatológico

Contagem de mulheres com um resultado de baixo risco no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com um resultado de alto risco no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I

Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco

Contagem de mulheres que realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o primeiro teste citopatológico e o próximo teste histopatológico

Tempo médio (meses) entre o teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I e o próximo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o segundo e terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco

Acompanhamento de mulheres com teste citopatológico com resultado de células atípicas de origem indeterminada (AOI)

Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um segundo teste (histo/citopatológico)

Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado negativo ou NIC I no teste histopatológico

Contagem de mulheres com resultado de cancer/adenocarcinoma/NIC II/NIC III no teste histopatológico

Contagem de mulheres com um resultado de baixo risco no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com um resultado de alto risco no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado de AOI (células atípicas de origem indeterminada) no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I

Contagem de mulheres que realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I

Contagem de mulheres que não realizaram um teste (histo/citopatológico) após um segundo teste com atypical cells of indeterminate origin result

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de AOI

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após um segundo teste citopatológico com resultado de AOI

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o primeiro teste citopatológico e o próximo teste histopatológico

Tempo médio (meses) entre o teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I e o próximo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de AOI

Tempo médio (meses) entre o segundo teste citopatológico com resultado de AOI e o próximo teste histopatológico

Acompanhamento de mulheres com mais de 24 anos com um teste citopatológico com resultado de HSIL

Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um segundo teste (histo/citopatológico)

Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado NIC I ou negativo no teste histopatológico

Contagem de mulheres com resultado de cancer/adenocarcinoma no teste histopatológico

Contagem de mulheres com resultado NIC II ou NIC III no teste histopatológico

Contagem de mulheres com resultado de baixo risco no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com resultado HSIL no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres com um resultado de alto risco no segundo teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado NIC I ou negativo

Contagem de mulheres que realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado NIC I ou negativo

Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco

Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o primeiro teste citopatológico e o próximo teste histopatológico

Tempo médio (meses) entre o teste histopatológico com resultado NIC I ou negativo e o próximo teste citopatológico

Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco

Acompanhamento de mulheres com menos de 25 anos com um teste citopatológico com resultado de HSIL

- Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico
- Contagem de mulheres que não realizaram um segundo teste (histo/citopatológico)
- Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico
- Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico após o primeiro teste citopatológico
- Contagem de mulheres com resultado negativo ou NIC I no teste histopatológico
- Contagem de mulheres com resultado de cancer/adenocarcinoma no teste histopatológico
- Contagem de mulheres com resultado NIC II ou NIC III no teste histopatológico
- Contagem de mulheres com resultado de baixo risco no segundo teste citopatológico
- Contagem de mulheres com um resultado de alto risco no segundo teste citopatológico
- Contagem de mulheres com resultado de HSIL no segundo teste citopatológico
- Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado NIC I ou negativo
- Contagem de mulheres que realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado NIC I ou negativo
- Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado NIC II/NIC III
- Contagem de mulheres que realizaram um teste citopatológico após um teste histopatológico com resultado NIC II/NIC III
- Contagem de mulheres que não realizaram um teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco
- Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de baixo risco
- Contagem de mulheres que não realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de HSIL
- Contagem de mulheres que realizaram um terceiro teste citopatológico após um segundo teste com resultado de HSIL
- Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico
- Tempo médio (meses) entre o primeiro teste citopatológico e o próximo teste histopatológico
- Tempo médio (meses) entre o teste histopatológico com resultado NIC I ou negativo e o próximo teste citopatológico
- Tempo médio (meses) entre o teste histopatológico com resultado NIC II/NIC III e o próximo teste citopatológico
- Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológicos após um segundo teste com resultado de baixo risco
- Tempo médio (meses) entre o segundo e o terceiro teste citopatológicos após um segundo teste com resultado de HSIL

Acompanhamento de mulheres com teste citopatológico com resultado de HSIL, não excluindo microinvasão ou carcinoma de células escamosas invasivo

- Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico
- Contagem de mulheres que não realizaram um teste histopatológico
- Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico
- Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico, mas não o teste histopatológico
- Contagem de mulheres com teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I
- Contagem de mulheres com resultado histopatológico de NIC II ou NIC III
- Contagem de mulheres com resultado histopatológico de carcinoma microinvasivo
- Contagem de mulheres com resultado histopatológico de carcinoma invasivo
- Tempo médio (meses) entre o teste citopatológico e o teste histopatológico

Acompanhamento de mulheres com teste citopatológico com resultado AIS ou adenocarcinoma invasivo

Contagem de mulheres que realizaram o primeiro teste citopatológico

Contagem de mulheres que não realizaram um teste histopatológico

Contagem de mulheres que realizaram um teste histopatológico

Contagem de mulheres que realizaram o segundo teste citopatológico, mas não o teste histopatológico

Contagem de mulheres com teste histopatológico com resultado negativo ou NIC I

Contagem de mulheres com resultado histopatológico de adenocarcinoma in situ ou carcinoma epidermóide

Contagem de mulheres com resultado histopatológico de carcinoma epidermóide microinvasivo/invasivo ou adenocarcinoma mucinoso/viloglandular

Tempo médio (meses) entre o teste citopatológico e o teste histopatológico

Resumo dos indicadores de acompanhamento

Contagem de mulheres do grupo LSIL/ASC-US com menos de 25 anos

Contagem de mulheres do grupo LSIL/ASC-US com menos de 25 anos que não realizaram o segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo LSIL/ASC-US com menos de 25 anos que realizaram o segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo sem atipias

Contagem de mulheres com atipias que não realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres com atipias que realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo ASC-US entre 25 e 29 anos

Contagem de mulheres do grupo ASC-US entre 25 e 29 anos que não realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo ASC-US entre 25 e 29 anos que realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo LSIL (com mais de 24 anos)/ASC-US (com mais de 29 anos)

Contagem de mulheres do grupo LSIL (com mais de 24 anos)/ASC-US (com mais de 29 anos) que não realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo LSIL (com mais de 24 anos)/ASC-US (com mais de 29 anos) que realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo ASC-H

Contagem de mulheres do grupo ASC-H que não realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo AGC

Contagem de mulheres do grupo AGC que não realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo AOI (células atípicas de origem indeterminada)

Contagem de mulheres do grupo AOI que não realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo HSIL com mais de 24 anos

Contagem de mulheres do grupo HSIL com mais de 24 anos que não realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo HSIL com menos de 25 anos

Contagem de mulheres do grupo HSIL com menos de 25 anos que não realizaram um segundo teste no período

Contagem de mulheres do grupo CANCER_LESAO

Contagem de mulheres do grupo CANCER_LESAO que não realizaram um teste histopatológico no período

Contagem de mulheres do grupo CANCER_LESAO que realizaram um teste histopatológico no período

Contagem de mulheres do grupo ADENOCARCINOMA

Contagem de mulheres do grupo ADENOCARCINOMA que não realizaram um teste histopatológico no período

Contagem de mulheres do grupo ADENOCARCINOMA que realizaram um teste histopatológico no período

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico no grupo sem atipia

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico no grupo LSIL/ASC-US de mulheres com menos de 25 anos

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico no grupo ASC-US de mulheres entre 25 e 29 anos

Tempo médio (meses) entre o primeiro e o segundo teste citopatológico no grupo LSIL (mulheres com mais de 24 anos)/ASC-US (mulheres com mais de 29 anos)

Tempo médio (meses) até o teste histopatológico no grupo CANCER_LESAO

Tempo médio (meses) até o teste histopatológico no grupo ADENOCARCINOMA